

Dimensions : 160 X 200 mm
Pantone Color : Black
GSM :
Pharma code : 277
Font Arabic : Winsoft Pro
Font English : Winsoft Pro,
Market: Domestic
Initiator :
Last update : 20 / 02/ 2014
Changes : New

160 X 200 mm SY600132LEF000

# برونشيكير®

## بلبس شراب

### خلاصة أيفي & تايم

قم بقراءة هذه المنشرة جيداً قبل تناول هذا الدواء :  
- حافظ على هذه المنشرة . قد تحتاج لقراءتها مرة أخرى.  
- إذا كان لديك أي أسئلة أخرى اسأل الطبيب أو الصيدلي .  
إن هذا الدواء قد تم صرفه خصيصاً لك بناءاً على وصفة طبية . ولهذا يجب عليك عدم إعطائه لأي شخص حتى وإن كان هذا الشخص يعاني من نفس الأعراض التي سبق وأن عانيت منها.  
قم بالاتصال بطبيبك المعالج أو الصيدلي في حال زيادة حدة الأعراض الجانبية أو الإصابة بعرض جانبي لم يتم ذكره في هذه المنشرة

حتوي هذه المنشرة على  
1- أما هو برونشيكير بلس وما هي دواعي استعماله  
2- قبل القيام بتناول برونشيكير بلس  
3- طريقة استخدام برونشيكير بلس  
4- الأعراض الجانبية  
5- ظروف تخزين برونشيكير بلس  
6- معلومات إضافية.

1 - ما هو برونشيكير بلس وما هي دواعي استعماله  
برونشيكير بلس : طارد للبلغم يساعد في تخفيف أعراض نزلة (التهاب الجهاز التنفسي المصحوبة بالسعال).

2 - قبل القيام بتناول برونشيكير بلس :  
أ- موانع استعمال برونشيكير بلس :  
إذا كنت تشكو من حساسية من المادة الفعالة أو النباتات المنتمة لعائلة الأرابية أو الشفوية.

ب- الاحتياطات عند استعمال برونشيكير بلس :  
لا يستعمل للأطفال أقل من 6 سنوات.  
ج- الحالات ضيق في التنفس . حمى . أو ظهور دم في البلغم فإنه ينبغي مراجعة الطبيب فوراً .

الاستعمال المتزامن مع مضادات الكحة مثل كوداين أو ديكستروميثورفان غير محبذ بدون الاستشارة الطبية.  
المرضى الذين يعانون من فرح المعدة .  
المرضى الذين يعانون من اضطرابات الغدة الدرقية .  
ج- التداخلات الدوائية مع أخذ برونشيكير بلس مع أي أدوية أخرى أو أعشاب أو مكملات غذائية :

لم تعلم أية آثار ضارة عند استخدام برونشيكير بلس شراب مع أدوية أخرى . لذلك قد يتم استخدام هذا المستحضر مع أدوية وعلاجات أخرى مثل المضادات الحيوية . الرجاء إعلام الطبيب أو الصيدلي إذا كنت تتناول أو تناولت في الأونة الأخيرة أي أدوية أخرى . بما في ذلك الأدوية التي تم الحصول عليها بدون وصفة طبية .

د- تناول برونشيكير بلس مع الطعام والشراب :  
يمكن تناول برونشيكير بلس قبل أو بعد تناول الطعام . إذا حدث بعض التهيح في المعدة فيمكن تناوله مع الطعام لتقليل الاضطرابات.

هـ- الحمل :  
لم يتم إثبات مأمونية الدواء في الحمل . أخبري الطبيب عند حدوث حمل أو التخطيط للحمل خلال فترة العلاج .  
و- الرضاعة :  
اسأل طبيبك أو الصيدلي للحصول على المشورة قبل تناول أي دواء .

ز- تأخير برونشيكير بلس على القيادة واستخدام الآلات :  
لا يجب أن يؤثر برونشيكير بلس على القيادة واستخدام الآلات .  
ح - معلومات هامة حول بعض مكونات برونشيكير بلس :  
إي 420 قد يكون له تأثير خفيف كمليين .

3 - طريقة استخدام برونشيكير بلس :  
تناول برونشيكير بلس شراب حسب تعليمات الطبيب، يجب أن تتحقق مع الطبيب أو الصيدلي إذا كنت غير متأكد من الجرعة .

الجرعة :  
طبيبك سوف يحدد ما هي الجرعة المناسبة لك .  
رج الرجاجة جيداً قبل الاستعمال .  
الأطفال فوق 6 سنوات : 5 مل ثلاث مرات يومياً .  
البالغين : 10 مل ثلاث مرات يومياً .

تعتمد مدة العلاج على نوع وشدة الحالة المرضية . ولكن في حال استمرار الأعراض لمدة تزيد عن اسبوع فيجب استشارة الطبيب أو الصيدلي .

أ- الجرعة الزائدة من برونشيكير بلس :  
اتصل بالطبيب أو اذهب إلى أقرب مستشفى أو وحدة طوارئ على الفور في حالة تناول جرعات زائدة .

الجرعة الزائدة:  
قد تسبب الجرعات الزائدة الغثيان والقيء والإسهال والهباج .  
في حال وجود اشتباه بحدوث استخدام جرعة زائدة يجب الحصول على عناية طبية فورية للأطفال و البالغين على السواء .

ب - نسيان تناول جرعة برونشيكير بلس :  
إذا نسيتم أن نتناول جرعة تناولها حالاً نتذكر ، ومع ذلك ، إذا أوشك وقت الجرعة التالية ، فقم بإلغاء الجرعة المنسية . وقم بالعودة إلى الجدول الزمني للجرعات العادية . لا تتناول جرعة مضاعفة لتعويض الجرعة المنسية .

ج - التوقف عن تناول برونشيكير بلس :  
لا تتوقف عن تناول برونشيكير بلس ما لم يخبرك الطبيب .  
إذا كان لديك أي أسئلة أخرى عن استخدام هذا المنتج ، اسأل الطبيب أو الصيدلي .

4 - الأعراض الجانبية :  
مثل جميع الأدوية ، يمكن أن يتسبب برونشيكير بلس في آثار جانبية . على الرغم من أنها لا تؤثر في الجميع .  
أخبر الطبيب على الفور إذا كنت تواجه أي من الأعراض التالية :

شائعة : اضطرابات الجهاز الهضمي ( الغثيان و القيء و الإسهال )  
غير شائعة : تفاعلات حساسية ( شرى ، طفح جلدي ، ضيق بالتنفس )  
إذا عانيت زيادة حدة أي من الآثار الجانبية أو إذا لاحظت أي آثار جانبية غير المدرجة في هذه المنشرة . يرجى إخبار الطبيب أو الصيدلي .

5 - ظروف تخزين برونشيكير بلس :  
يبقى بعيداً عن متناول وبصر الأطفال .  
لا يحفظ فوق 30 °م .  
يجب حفظ الدواء في عبوته الأصلية .  
لا تستخدم هذا الشراب بعد تاريخ انتهاء الصلاحية المبين على العبوة . تاريخ الانتهاء يشير إلى اليوم الأخير من ذلك الشهر .

لا تستخدم برونشيكير بلس إذا كنت تلاحظ وجود علامات واضحة على تلفه .  
لا ينبغي أن يتم التخلص من الأدوية عن طريق مياه الصرف الصحي أو عن طريق النفايات المنزلية . اسأل الصيدلي عن كيفية التخلص من الأدوية التي لم تعد مطلوبة . ومن شأن هذه التدابير أن تساعد على حماية البيئة .

6 - معلومات إضافية:  
أ- ما هي محتويات برونشيكير بلس :  
المواد الفعالة : 0.7 جم من خلاصة أوراق الأيفي الجافة و 1 جم من خلاصة الثام الجافة .  
الصوامغ الأخرى هي إي 954 ، إي 415 ، إي 420 ، إي 331 ، إي 202 ، جلوكول عديد الإيثيلين 400 و ماء منقى .

ب- ما هو الشكل الصيدلاني لبرونشيكير بلس ووصفه وحجم عبوته :  
برونشيكير بلس شراب هو سائل بني ذو قوام لزج وطعم ورائحة مستساغة .  
حتوي العبوة على زجاجة سعة 150 مل .

ج- اسم و عنوان مالك رخصة التسويق والصنع :  
تصنيع : شركة ديف للصناعات الدوائية .  
السعودية - القصيم - البدائع

هاتف: 0163323333 فاكس: 0163324444 البريد الإلكتروني: medrapv@deef.com  
لصالح: شركة سانوفي أفنتس العربية المحدودة  
السعودية - جدة 21423

د- تم الموافقة على هذه المنشرة بتاريخ 05 - 2015  
رقم النسخة A10138-00



سانوفي

سانوفي

سانوفي

سانوفي

سانوفي

سانوفي

سانوفي

سانوفي

سانوفي

سانوفي

سانوفي

سانوفي

سانوفي

سانوفي

سانوفي

سانوفي

سانوفي

سانوفي

سانوفي

سانوفي

سانوفي

سانوفي

سانوفي

سانوفي

سانوفي

سانوفي

سانوفي

سانوفي

سانوفي

سانوفي

سانوفي

سانوفي

سانوفي

سانوفي

سانوفي

سانوفي

سانوفي

سانوفي

سانوفي

سانوفي

سانوفي

سانوفي

سانوفي

سانوفي

سانوفي

سانوفي

سانوفي

PRODUCT	Bronchicum Plus Syrup (Sanofi) Domestic	DRAWING NO.	A10408-00	Partner Approval
ITEM		ITEM CODE	SY600132LEF000	Name:
PREPARED BY	REVIEWED BY			Post :
Originator	Medical manager	Marketing Director	Medical & RA Director	Comments:
Sign:				
/ / 2015	/ / 2015	/ / 2015	/ / 2015	
Sign:				/ / 2015