

برونشيكيير®

إيفي شراب

خلاصة أوراق اللبلاب الجففة

قم بقراءة هذه النشرة جيداً قبل تناول هذا الدواء:

- حافظ على هذه النشرة . قد تحتاج لقراءتها مرة أخرى.
- إذا كان لديك أي أسئلة أخرى . اسأل الطبيب أو الصيدلي.
- إن هذا الدواء قد تم صرفه خصيصاً لك بناءً على وصفة طبية . ولهذا يجب عليك عدم إعطائه لأي شخص حتى وإن كان هذا الشخص يعاني من نفس الأعراض التي سبق وأن عانيت منها.
- قم بالاتصال بطبيبك المعالج أو الصيدلي في حال زيادة حدة الأعراض الجانبية أو الإصابة بعرض جانبي لم يتم ذكره في هذه النشرة.

حتوي هذه النشرة على:

- 1 - ما هو برونشيكيير إيفي وما هي دواعي استعماله.
- 2 - قبل القيام بتناول برونشيكيير إيفي.
- 3 - طريقة استخدام برونشيكيير إيفي.
- 4 - الأعراض الجانبية.
- 5 - ظروف تخزين برونشيكيير إيفي.
- 6 - معلومات إضافية.

1 - ما هو برونشيكيير إيفي وما هي دواعي استعماله:
برونشيكيير إيفي هو شراب حال من السكر مهدي للسهال برونشيكيير إيفي شراب هو منتج طبيعي يحتوي على مواد عشبية فعالة. طار للتحقق مسبقاً في تخفيف أعراض نزلة (التهاب) الجهاز التنفسي الصحية بالسهال.

2 - قبل القيام بتناول برونشيكيير إيفي:
أ- موانع استعمال برونشيكيير إيفي:
إذا كنت تشكو من حساسية من المادة الفعالة أو النباتات المنمية لعائلة الأرابية أو الشفوية. إذا كنت تشكو من حساسية من أي من مكونات المستحضر. لا يستعمل للأطفال أقل من 6 سنوات.

ب- الاحتياطات عند استعمال برونشيكيير إيفي:

تحقق مع الطبيب أو الصيدلي قبل استخدام هذا الدواء في الحالات التالية:
في حالات ضيق في التنفس . حمى . أو ظهور دم في البلغم فإنه ينبغي مراجعة الطبيب فوراً
الاستعمال المتزامن مع مضادات الكحة مثل كودابين أو ديكستروميثورفان غير محدد بدون الإشتشارة الطبية.

المرضى الذين يعانون من فرح المعدة.

المرضى الذين يعانون من اضطرابات الغدة الدرقية.

ج- التداخلات الدوائية مع الأوية الأخرى غير معروفة.

استشر الطبيب أو الصيدلي إذا كنت تتناول أو تناولت في الأونة الأخيرة أي أدوية أخرى . بما في ذلك الأدوية التي تم الحصول عليها بدون وصفة طبية.

د- تناول برونشيكيير إيفي مع الطعام والشراب:

يمكن تناول برونشيكيير إيفي قبل أو بعد تناول الطعام. إذا حدث بعض التهيح في المعدة فيمكن تناوله مع الطعام لتقليل الاضطرابات.

هـ- الحمل:

لم يتم إثبات مأمونية الدواء في الحمل . أخبري الطبيب عند حدوث حمل أو التخطيط للحمل خلال فترة العلاج.

اسأل طبيبك أو الصيدلي للحصول على المشورة قبل تناول أي دواء.

و- الرضاعة:

لم يتم إثبات مأمونية الدواء في الرضاعة.

اسأل طبيبك أو الصيدلي للحصول على المشورة قبل تناول أي دواء.

ز- تأثير برونشيكيير إيفي على القيادة واستخدام الآلات:

لا يجب أن يؤثر برونشيكيير إيفي على القيادة واستخدام الآلات.

12 - معلومات هامة حول بعض مكونات برونشيكيير إيفي:

إي 420 قد يكون له تأثير خفيف كمي.

3 - طريقة استخدام برونشيكيير إيفي:

تناول برونشيكيير إيفي شراب حسب تعليمات الطبيب. يجب أن تتحقق مع الطبيب أو الصيدلي إذا كنت غير متأكد من الجرعة.

طبيبك سوف يحدد ما هي الجرعة المناسبة لك.

رج الزجاجة جيداً قبل الاستعمال.

الأطفال فوق 6 سنوات : 5 مل ثلاث مرات يومياً .

البالغين : 5 - 7.5 مل ثلاث مرات يومياً.

تعتمد مدة العلاج على نوع وشدة الحالة المرضية . ولكن في حال استمرار الأعراض لمدة تزيد عن اسبوع فيجب استشارة الطبيب أو الصيدلي.

أ- الجرعة الزائدة من برونشيكيير إيفي:

اتصل بالطبيب أو اذهب إلى أقرب مستشفى أو وحدة طوارئ على الفور في حالة تناول جرعات زائدة .

الجرعة الزائدة:

قد تسبب الجرعات الزائدة الغثيان و القيء والإسهال والتهاج

في حال وجود اشتباه بحدوث استخدام جرعة زائدة يجب الحصول على عناية طبية فورية للأطفال و البالغين على السواء

ب - نسيان تناول جرعة برونشيكيير إيفي:

إذا نسييت أن تتناول جرعة تناولها حالما تتذكر. ومع ذلك . إذا أوشك وقت الجرعة التالية . قم بالغاء الجرعة

المنسية . وقم بالعودة الى الجدول الزمني للجرعات العادية . لا تتناول جرعة مضاعفة لتعويض الجرعة المنسية.

ج - التوقف عن تناول برونشيكيير إيفي:

لا تتوقف عن تناول برونشيكيير إيفي ما لم يحرك الطبيب

إذا كان لديك أي أسئلة أخرى عن استخدام هذا المنتج . اسأل الطبيب أو الصيدلي.

4 - الأعراض الجانبية:

مثل جميع الأدوية . يمكن أن يتسبب برونشيكيير إيفي في آثار جانبية . على الرغم من أنها لا تؤثر في الجميع.

أخبر الطبيب على الفور إذا كنت تواجه أي من الأعراض التالية:

شائعة : اضطرابات الجهاز الهضمي (الغثيان و القيء و الإسهال)

غير شائعة : تفاعلات حساسية (شرى . طفح جلدي . ضيق بالتنفس)

إذا عانيت زيادة حدة أي من الآثار الجانبية أو إذا لاحظت أي آثار جانبية غير المدرجة في هذه النشرة . يرجى إخبار الطبيب أو الصيدلي.

5 - ظروف تخزين برونشيكيير إيفي:

يغني بعيداً عن متناول وبصر الأطفال.

لا يحفظ فوق 30 °.

يستعمل خلال شهر من تاريخ فتح العبوة.

يجب حفظ الدواء في عبوته الأصلية.

لا تستخدم هذا الشراب بعد تاريخ انتهاء الصلاحية المبين على العبوة . تاريخ الانتهاء يشير إلى اليوم الأخير من ذلك الشهر.

لا تستخدم برونشيكيير إيفي إذا كنت تلاحظ وجود علامات واضحة على تلفه.

لا ينبغي أن يتم التخلص من الأدوية عن طريق مياه الصرف الصحي أو عن طريق النفايات المنزلية . اسأل الصيدلي عن كيفية التخلص من الأدوية التي لم تعد مطلوبة . ومن شأن هذه التدابير أن تساعد على حماية البيئة.

6 - معلومات إضافية:

أ- ما هي محتويات برونشيكيير إيفي:

المواد الفعالة : 0.7 جم من خلاصة أوراق اللبلاب الجافة.

المواد الأخرى هي : 216 | 218 | 330 | 415 | 420 | 422 | 954 | 1520 و ماء منقى.

ب- ما هو الشكل الصيدلاني لبرونشيكيير إيفي ووصفه وحجم عبوته:

برونشيكيير إيفي شراب هو سائل بني ذو قوام لزج وطعم ورائحة مستساغة.

حتوي العبوة على زجاجة سعة 100 مل.

ج- اسم وعنوان مالك رخصة التسويق والمنصع:

تصنيع: شركة ديف للصناعات الدوائية. السعودية - القصيم - البدائع

هاتف: 0163323333 فاكس: 0163324444 البريد الإلكتروني: medrapv@deef.com

لصالح: شركة سانوفي أفنتس العربية المحدودة

السعودية - جدة 21423

د- تم الموافقة على هذه النشرة بتاريخ 05 - 2015 رقم النسخة 00-AI0406

للإبلاغ عن الأعراض الجانبية

- المركز الوطني للتبظ والسلامة الدوائية فاكس: للإبصال 00966112057662
- بالإدارة التنفيذية للتبظ وإدارة الأزمات. هاتف: 9661120382222
- جوبيلة 2356 - 2317 - 2354 - 2334 - 2340 - 2353
- الهاتف المجاني: 8002490000
- الإتصال السريع: 19999
- بريد إلكتروني: npc.drug@sfda.gov.sa
- الموقع الإلكتروني: www.sfda.gov.sa/npc

إن هذا الدواء

- الدواء مستحضر يؤثر على صحتك و استهلاكه خلافاً للتعليمات قد يعرضك للخطر .
- إتبع بدقة وصفة الطبيب و طريقة الاستعمال المنصوص عليها و تعليمات الصيدلي الذي صرفها لك .
- إن الطبيب و الصيدلي هما الخبيران في الدواء و ينفعه و ضرره .
- لا تقطع مدة العلاج المحددة لك من تلقاء نفسك .
- لا تكرر صرف الدواء بدون إشتشارة الطبيب .
- لا تترك الأدوية في متناول أيدي الأطفال .

مجلس وزراء الصحة العرب واتحاد الصيادلة العرب